

## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### 1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

$a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ ,  $b \neq 0$ ,  $x$  ve  $y$  değişken olmak üzere,  $ax+by+c=0$  biçimindeki denklemelere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir.  $ax+by+c=0$  denkleminin çözüm kümesi sonsuz tane sıralı ikiliden oluşur. Çözüm kümesi analitik düzlemede bir doğru belirtir.

#### İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMİ

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

sistemine iki bilinmeyenli denklem sistemi denir. Bu tür denklem sistemlerinin çözüm kümesi (eğer varsa) bulunurken iki farklı çözüm yapılabılır.

#### 1. YOK ETME YÖNTEMİ

Bilinmeyenlerden herhangi birinin katsayıları eşitlenir, taraf tarafa çıkartılır.

**Örnek...1 :**

$$\begin{aligned} x-y &= 9 \\ 2x+y &= 23 \end{aligned}$$

sistemini sağlayan  $x$  değeri kaçtır?

**Örnek...2 :**

$$(a+b-13)^{32} + (a-b-9)^{44} = 0$$

ise  $(a,b)$  ikilisini bulunuz.

**Örnek...3 :**

$$\begin{aligned} 3x+y &= 5 \\ \frac{2x-3}{y} &= 2 \end{aligned}$$

sistemini sağlayan  $y$  değeri kaçtır?

**Örnek...4 :**

$a$  ve  $b$  doğal sayılar olmak üzere,  
 $(3a+2).(a+b)=20$  ise  $a+b$  en çok kaçtır?

**Örnek...5 :**

$$\begin{aligned} mx - (n+2)y &= 5 \\ x + (m+n)y &= 7 \end{aligned}$$

sistemini sağlayan  $(x,y)$  ikilisi  $(2,-3)$  ise  $m,n$  değeri kaçtır?

## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### 2.YERİNE KOYMA YÖNTEMİ

Denklemelerden herhangi birinde, değişkenlerden biri yalnız bırakılır ve bulunan bu değer, diğer denklemde yerine yazılır

#### Örnek...6 :

$$\begin{aligned}x + y &= 11 \\2x + 5y &= 34\end{aligned}$$

sistemini sağlayan x değeri kaçtır?

#### Örnek...7 :

$$\begin{aligned}x-y &= 5 \\|2x+y| &= 13\end{aligned}$$

sistemini sağlayan y değerleri çarpımı kaçtır?

#### Örnek...8 :

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} + \frac{1}{x} &= 2 \\\frac{3}{y} + \frac{2}{x} &= 5\end{aligned}$$

ise x kaçtır?

#### Örnek...9 :

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{ab} &= 3 \\\frac{3a-2b}{ab} &= 4\end{aligned}$$

ise a kaçtır?

### HATIRLATMA

$ax + by + c = 0$  denkleminin çözüm kümesi sonsuz tane sıralı ikiliden oluşur. Çözüm kümesi analitik düzlemede bir doğru belirtir. Bu doğru çizilirken iki nokta bulmak yeterlidir. Bulunan noktaların birleştirilmesiyle doğru çizilmiş olur.

#### Örnek...10 :

Denklemi verilen doğruların grafiklerini çiziniz.

a)  $3x - 4y - 12 = 0$

b)  $x + 5y = 3$

c)  $y = 3x$

## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### Örnek...11 :

Doğruları verilen koşulla beraber çiziniz.

a)  $x+y=8$  ve  $x>2$

b)  $3x-5y=6$   $y<-2$

c)  $x \geq 5$   $y-x+3=0$

### GENELLEME

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

iki bilinmeyenli denklem sisteminde her bir ifade bir doğru belirttiğinden, doğruların durumuna göre çözüm incelenebilir:

- 1)  $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$  ise doğrular kesişir dolayısıyla tek çözüm vardır.
- 2)  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$  ise doğrular çakışır dolayısıyla sonsuz çözüm vardır.
- 3)  $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$  ise doğrular paraleldir dolayısıyla çözüm yoktur.

### Örnek...12 :

$$\begin{aligned} (3m-2)x+4y &= 12 \\ 5x+(n-5)y &= 16 \end{aligned}$$

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise  $m+n$  toplamı kaçtır?

### Örnek...13 :

$$\begin{aligned} x-my &= 12 \\ 3x+5y &= 21 \end{aligned}$$

sisteminin çözümü boş küme ise  $m$  değeri ne olabilir?

## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### Örnek...14 :

$$\begin{aligned}(a+7)x - ay &= 12 \\ 2x + 3y &= 25\end{aligned}$$

denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı ise  $a$  seçimi nasıl olmalıdır?

### UYARI

$ax + by = 0$  denklemi her  $x$  ve  $y$  değeri için sağlanıyorsa,  $a=0$  ve  $b = 0$  olmalıdır.

### Örnek...15 :

$(2x-y+5)a + (x+y)b = 0$  eşitliği her  $a$ ,  $b$  için doğru ise  $y$  kaçtır?

### Örnek...16 :

$(m-3)x + (n+1)y = 0$  denklemi her  $x$  ve  $y$  reel sayısı için sağlanıyorsa  $(m,n)$  ikilisi ne olmalıdır?

### Örnek...17 :

$m$  ve  $n$  tam sayılar olmak üzere

$$\frac{1}{n-m} + \frac{1}{n+m-10} = 1$$

eşitliğini sağlayan  $m$  ve  $n$  değerlerini bulunuz.

### Örnek...18 :

$$a+b=2$$

$$a+c=7$$

$b+c=9$  ise  $a \cdot b \cdot c$  kaçtır?

### Örnek...19 :

$$a+2b=3$$

$$a+4c=4$$

$$b-c=5$$

olduğuna göre,  $a$  kaçtır?

## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### Örnek...20 :

a, b, c negatif reel sayılar ve  
 $a \cdot b = 12$   
 $a \cdot c = 3$   
 $b \cdot c = 4$   
olduğuna göre,  $a \cdot b \cdot c$  kaçtır?

### Örnek...22 :

$x - 5y + 8 \geq 0$  eşitsizliğini düzlemede çiziniz.

## EŞITSİZLİK GRAFİKLERİ

$ax + by + c < 0$  ifadesi koordinat düzleminde gösterilirken:

- ADIM 1**  $ax + by + c = 0$  alınarak grafiğe ait noktalar bulunur
- ADIM 2**  $<, >$  için kesikli,  $\leq$ ,  $\geq$  için sürekli şekilde grafik çizilir
- ADIM 3** Grafiğe ait olmayan bir nokta denenerek bölge bulunur
- ADIM 4** Bulunan bölge taranır.

### Örnek...23 :

$x + 3y > 0$  eşitsizliğini düzlemede çiziniz

### Örnek...21 :

$3x - 2y - 12 < 0$  eşitsizliğini düzlemede çiziniz

### Örnek...24 :

$x - 2y + 4 \geq 0$ ,  $x - 2y - 4 < 0$  eşitsizlik sistemini düzlemede çiziniz

## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### Örnek...25 :

$5x - 4y + 20 \geq 0$ ,  $2x + 3y + 8 < 0$  eşitsizlik sistemini düzlemede çiziniz

### Örnek...26 :

$x - 4y + 8 > 0$ ,  $3x + 2y - 4 < 0$  ve  $y > 0$  eşitsizlik sisteminin düzlemede sınırladığı bölgenin alanını bulunuz

### Örnek...27 :

$\frac{x}{5} + \frac{y}{4} < 1$ ,  $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} < 1$  ve  $x > 0$  eşitsizlik sisteminin düzlemede sınırladığı bölgenin alanını bulunuz

### Örnek...28 :


$|\frac{x}{4}| = 3$ ,  $|y - \frac{2}{3}| = 5$  eşitsizlik sisteminin düzlemede sınırladığı bölgenin alanını bulunuz

### Örnek...29 :

$|x - 3\frac{y}{4}| < 1$ , eşitsizlik sisteminin düzlemede sınırladığı bölgeyi çizerek gösteriniz.

## HATIRLATMA

Şekilde x eksenini A(a,0) ve y eksenini B(0,b) noktasında kesen doğrunun denklemi  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$  olarak yazılabilir.




## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMİYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )


### Örnek...30 :

Takip eden örneklerde taralı bölgeyi eşitsizlik sistemleriyle ifade ediniz.


a)




b)




c)



d)



e)



## SAYILAR – 6

( BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ )

### DEĞERLENDİRME - 1

1)  $2x - y = 8$   
 $x + y = 13$

olduğuna göre,  $x - y$  kaçtır?

2)  $x + 2y = 4$   
 $3x + y = 17$

denklem sistemini sağlayan  $(x, y)$  ikilisi nedir?

3)  $2x + 3y - 28 = 0$   
 $3x + 2y - 27 = 0$

olduğuna göre,  $x - y$  farkı kaçtır?

4)  $2x - my = 6$ ,  
 $nx + 3y = 3$

denklem sisteminin çözümü  $(1,2)$  ikilisi ise  $(m,n)$  ikilisi nedir?

5)  $ax + y + 2 = 0$   
 $2x + 3y + b = 0$

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre,  $a + b$  toplamı kaçtır?

6)  $(3m-2)x+4y=12$   
 $5x + (n-5)y = 16$

denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre,  $m + n$  toplamı kaçtır?

7)  $2x - ay = 12$   
 $(a + 7)x + 3y = 32$

denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre,  $a$  kaç olabilir?

8)  $(3a + 1).x + 3y - 8 = 0$   
 $5x + y + 12 = 0$

denklem sisteminin çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için,  $a$  kaç olmalıdır?

9)  $(m-3)x + (1+n)y = 0$  denklemin her  $(x,y)$  için sağlanıyorsa  $(m,n)$  ikilisi nedir?

10)  $xy - 3y = 2$  ise  $x$  in hangi değeri için  $y$  bulunamaz?